



***Aeolidia papillosa* (Linnaeus, 1761)**

Eolidien à papilles

Description

Aeolidia papillosa est un nudibranche qui peut atteindre jusqu'à 12 cm de long. Son corps oval et aplati est large et se rétrécit pointe dans sa partie postérieure. Il est densément couvert de nombreuses céraptes fines et allongées, terminées en pointes parfois recourbées, sauf sur une ligne médiane au centre du dos. L'avant porte deux longs et fins tentacules ainsi que deux rhinophores bien visibles. Sa coloration est variable: de crème à brun, ou de rose-orangé à violet foncé. Les céraptes, rhinophores et tentacules ont l'extrémité blanche. Une marque blanche en forme de V peut se remarquer sur la tête et se prolonger sur la partie du dos dépourvue de céraptes. L'éolidien à papilles se nourrit de différentes anémones de mer, *Actinia* spp., *Anemonia* spp., *Sargatia* spp. ...



Baie de Concarneau, France, sur l'estran, 2006, WBN

Distribution

Aeolidia papillosa se rencontre depuis la surface jusqu'à 800 m de profondeur dans la partie nord de l'Atlantique à partir du Golfe de Gascogne, en Manche et en Mer du Nord.

Auteur

Textes de Anne Bay-Nouailhat © 2008 - 2026