



Mer et littoral - La vie marine de l'Europe de l'ouest

www.mer-littoral.org/14/buccinum-undatum.php

Document téléchargé le 26 janvier 2026.

***Buccinum undatum* Linnaeus, 1758**

Bulot, buccin

Description

Buccinum undatum est un gastéropode qui mesure jusqu'à 10 cm de long. Sa coquille robuste et conique à l'apex pointu est composée de sept à huit spires. Elle est marquée de côtes spiralées et de larges côtes axiales. La coquille blanche à grise est couverte d'un péricostracum jaune brunâtre. L'ouverture est large, ovale et présente à son extrémité un court canal siphonal. Elle est fermée par un opercule corné visible à l'arrière du pied lorsque l'animal sort de sa coquille. Le corps est trapu et le pied large. La tête possède deux longs tentacules et dans sa partie supérieure un long siphon. Il est de couleur blanche à blanc crème avec des taches noires. Le bulot se nourrit de vers et de mollusques bivalves qu'il déniche dans la vase, le sable, le sable grossier ou les milieux rocheux.



www.mer-littoral.org © W. Bay-Nouailhat

Rade de Brest, France, 14 mètres, 2008, WBN

Distribution

Buccinum undatum vit depuis le bas de la zone des marées jusqu'à 1200 mètres de fond en Atlantique, Manche, Mer du Nord.

Auteur

Textes de Anne Bay-Nouailhat © 2011 - 2026