

***Lissoclinum perforatum* (Giard, 1872)**

Didemnide perforé

Description

Lissoclinum perforatum est une ascidie coloniale encroûtante de 2 à 3 cm. Les colonies forment des croûtes blanches d'environ 3 à 4 mm d'épaisseur aux bords arrondis. Les zoïdes : individus d'une colonie, de petite taille sont réunis dans une tunique commune appelée le cormus. Les siphons buccaux, régulièrement répartis, forment de petits poressur toute la surface de la colonie donnant l'impression d'une multitude de petits points noirs. Les siphons cloacaux plus gros et moins nombreux ont un bord saillant. Les zoides sont organisés en systèmes autour d'un siphon cloacal commun. Les didemnides perforés vivent fixés aux roches parfois parmi les algues, dans des zones littorales battues par la marée ou des zones de courant.



www.mer-littoral.org

Iles Glénan, France, 8 mètres, 2011, WBN

Espèces proches

Il existe de nombreuses espèces d'ascidies encroûtantes. On peut citer: *Lissoclinum weigelei* dont la surface paraît tachetée de points bruns, les ascidies du genre *Didemnum*, notamment *Didemnum coriaceum* et *D. maculosum* dont les siphons buccaux sont plus petits et moins visibles.



© W. Bay-Nouailhat

Baie de Concarneau, France, 3 mètres, 2011, WBN

Auteur

Textes de Anne Bay-Nouailhat © 2007 - 2026