



Cyclopterus lumpus Linnaeus, 1758

Lompe

Description

Cyclopterus lumpus est un poisson qui atteint 50 cm de long. Son corps est trapu et massif. Dépourvu d'écaillés, il est couvert de petites plaques osseuses et parcouru de rangées de gros tubercules osseux bien visibles sur les flancs. La nageoire dorsale s'épaissit avec l'âge pour former une sorte de crête peu distincte du reste du corps chez l'adulte. Les nageoires pelviennes forment une ventouse ce qui permet au lompe de se poser sur le substrat. Sa coloration varie du gris verdâtre à gris bleuté. Les mâles en période de reproduction prennent des teintes plus vives : bleu foncé sur le dos et orange sur le ventre et les nageoires. Pendant la période de reproduction, de février à mai, les lompes viennent pondre sur le littoral et les mâles s'occupent des oeufs entre 6 à 7 semaines jusqu'à la naissance des petits. C'est à ce moment qu'on a le plus de chance de l'apercevoir.

Distribution

Cyclopterus lumpus vit la plupart du temps entre 50 m et 300 m de profondeur mais en période de reproduction, il remonte jusqu'en surface. Il vit en Atlantique nord, Baltique, Mer du Nord, se rencontre également occasionnellement en Manche et plus au sud dans le Golfe de Gascogne jusqu'à de rares occurrences au nord du Portugal.

Auteur

Textes de Anne Bay-Nouailhat © 2009 - 2026



Zélande, Pays-Bas, 11 mètres, 2008, JJ