Scyllarides latus

Grande cigale de mer

Description

Scyllarides latus est un crustacé qui peut mesurer jusqu'à 45 cm de long. Sa carapace est massive, aplatie et quasiment rectangulaire. Son abdomen est robuste, muni d'épines et le telson, plus large que long, forme un éventail aux bords rectilignes. Il est dépourvu de pinces. Il possède une paire d'antennules encadrées par une paire d'antennes courtes. Ces antennes ont une forme particulière : elles sont composées de deux larges lames superposées plus ou moins articulées. La première, fixée à la carapace, présentede larges épines sur ses bords. La seconde, qui constitue l'extrémité de l'antenne est arrondie. Les pattes ou périopodes, sont courtes et sans pince sauf chez la femelle dont la cinquième paire de pattes se termine par une petite pince pour nettoyer les oeufs qu'elle portesous l'abdomen. La coloration est brun rougeâtre. L'extrémité des pattes est noire, le premier segment de l'abdomen est tacheté de rougeet les antennes sont bordées de violet. La surface du corps est couverte de petites tubercules. La cigale de mer vit sur les fonds rocheux, sous les surplombs, dans les grottes.

Illes Medes, Espagne, 17 mètres, 2011, WBN

Distribution

Scyllarides latus vit depuis 3 mètres jusqu'à 100 mètres de profondeur en Méditerranée et en Atlantique jusqu'au Portugal.

Capo Rosso, France, 20 mètres, 2011, WD

Auteur

Textes de Anne Bay-Nouailhat © 2007 - 2025

Baie de Porto, France, 15 mètres, 2011, WD