Mer et littoral - La vie marine de l'Europe de l'ouest

www.mer-littoral.org/32/botrylloides-leachii.php
Document téléchargé le 13 août 2025.

Botrylloides leachii

Botrylle de Leach

Description

Botrylloides leachii est une ascidie qui forme des colonies encroûtantes de quelques centimètres de long. Les colonies plates et plutôt charnues recouvrent les roches, les crampons de laminaires ou d'autes ascidies. Les zoïdesd'environ 1,5 mm chacun sont disposés en deux lignes parallèles autour d'un siphon cloacal commun. Ce type d'organisationla distingue de l'espèce proche Botryllus schlosseri dont les zoïdes sont disposés en 'étoiles'. La colonie est composéede plusieurs groupes de zoïdes englobés dans une tunique commune appelée cormus. Sa coloration est variable, grise, orange ou rouge.

Baie de Concarneau, France, 6 mètres, 2014, WBN

Distribution

Botrylloides leachii vit depuis la surface jusqu'à 15 m de profondeur en Atlantique, Manche, Mer du Nord et Méditerranée.

Camaret, France, 2 mètres, 2014, WBN

Auteur

Textes de Anne Bay-Nouailhat © 2007 - 2025

Camaret, France, 3 mètres, 2014, WBN